



**Sexual-  
störungen**



## **Cefagil® - Tabletten**

*Homöopathisch*

### **Anwendung** .....

*Sexuelle Schwäche*

### **Wirkstoff** .....

*Turnera diffusa var. aphrodisiaca: Damiana*

*Der vor allem im Golfgebiet Mexikos, der Karibik und im südlichen Afrika verbreitete aromatisch riechende Strauch, verwandt mit der Pflanzenfamilie der Passionsblumen, wurde bereits von den Azteken in Mittelamerika zur Bereitung eines Liebestrankes verwendet und heißt noch heute im Volksmund „Rompe camisa macho“, zu deutsch „Zerreißt dem Mann das Hemd“.*

### **Wirkprinzip** .....

*Die Inhaltsstoffe der homöopathischen Damiana-Zubereitung steigern die Durchblutung des Unterleibes und stimulieren die Erregbar-*

*keit der Sexualorgane. Sexuelle Leistungsfähigkeit und Lustempfinden bei Frau und Mann werden gestärkt, einem Nachlassen wird schonend entgegengewirkt bzw. vorgebeugt.*

### **Tips zur Einnahme** .....

*1 - 3 Tabletten täglich über mehrere Wochen. Bei akutem Bedarf halbstündlich 1 Tablette einnehmen.*

**Nicht vergessen:**

*Ausgewogene Ernährung. Mineralstoffe, Vitamine. Nikotin, Alkohol, Streß meiden. Körperpflege. Entspannungstechniken. Massagen. Atmosphäre schaffen (Musik, Aromen). Zärtlichkeit, Vertrauen, offen über Probleme sprechen.*

### **Der besondere Vorteil** .....

*aktiviert Cefagil® die sexuelle Erlebnisfähigkeit - bei Frau und Mann - auf natürliche Weise.*



Gebrauchsinformation umseitig!





## Gebrauchsinformation

### Cefagil® - Tabletten

Wirkstoff: Turnera diffusa

Z.Nr.: 3-00189

#### Zusammensetzung:

1 Tablette enthält:  
25 mg Turnera diffusa  $\emptyset$ , Lactose, Magnesiumstearat.

#### Arzneiform:

Tabletten, Homöopathische Arzneispezialität

#### Packungsgrößen:

100, 200 Tabletten

#### Pharmazeutisch-therapeutische Kategorie und Wirkungsweise:

Die homöopathische Tinktur aus Turnera diffusa (Damiana) wird aus den Blättern eines in der Karibik und in Mexiko vorkommenden Strauches hergestellt. Die Pflanze war schon den Azteken als Aphrodisiakum bekannt und wird auch in der modernen Medizin bei sexueller Schwäche und Libidoverlust angewandt.

#### Zulassungsinhaber und Hersteller:

Cefak KG, Ostbahnhofstraße 15, D-87437 Kempten

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche.

#### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Eine krankheitsbedingte Ursache der sexuellen Schwäche ist vor Einnahme des Arzneimittels abzuklären.

#### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie Cefagil® nicht anwenden?*

Bei bestehender Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil des Präparates.

Nicht anwenden bei Kindern.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillperiode beachten?*

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung besteht keine Einschränkung während der Schwangerschaft und Stillperiode.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung und besondere Warnhinweise:

Bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch keine.

Arzneimittel für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

#### Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

#### Dosierung und Art der Anwendung:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, 1 Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3mal täglich 1 Tablette einnehmen.

Cefagil® Tabletten können gekaut oder mit etwas Flüssigkeit (z.B. Wasser) geschluckt werden.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### Überdosierung

Bei der Einnahme größerer Mengen (z.B. Packungsinhalte) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

#### Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Verfalldatum und Lagerung:

Verfalldatum beachten! Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf der Durchdrückpackung und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Erstelldatum: November 2001

Bei Unklarheiten sollten Sie eine fachliche Beratung bei Ihrem Arzt oder Apotheker einholen.

TAA  
32.1453

Vertrieb Österreich: Kwizda Pharma  
Effingergasse 21  
A-1160 Wien

Cefak KG · Postfach 1360 · D-87403 Kempten

