

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.



Femikliman® uno

Wirkstoff: Cimicifugawurzelstock-Trockenextrakt

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 Filmtablette enthält 6,5 mg Trockenextrakt aus Cimicifugawurzelstock (4,5-8,5 : 1);

Auszugsmittel: Ethanol 60 Vol.-%

Sonstige Bestandteile:

Cellulosepulver, hochdisperses Siliciumdioxid, Lactose-Monohydrat, Macrogol 4000, Maisstärke, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Hypromellose, mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph.Eur.), Titandioxid (E 171)

Hinweis für Diabetiker

1 Filmtablette enthält 0,01 Proteinheiten (BE).

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen mit

30 (N1), 60 (N2) und 100 (N3) Filmtabletten

Pflanzliches Arzneimittel bei Wechseljahresbeschwerden

HEXAL AG

Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen

Telefon: (08024) 908-0,

Telefax: (08024) 908-1290

e-mail: patientenservice@hexal.de

Hersteller

SALUTAS Pharma GmbH,

ein Unternehmen der HEXAL AG

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Anwendungsgebiete

Zur Besserung von psychischen und neurovegetativen Beschwerden, bedingt durch die Wechseljahre

Hinweis

Bei Störungen bzw. Wiederauftreten der Regelblutung sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden anderen Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die der Abklärung durch einen Arzt bedürfen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Femikliman® uno nicht anwenden?

Sie dürfen das Arzneimittel nicht anwenden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil oder einem der sonstigen Bestandteile sind.

Falls Sie wegen eines östrogenabhängigen Tumors in ärztlicher Behandlung sind oder waren, dürfen Sie Femikliman® uno nicht anwenden, da nicht bekannt ist, ob Cimicifugawurzelstock-Extrakte östrogenabhängige Tumoren fördern oder unbeeinflusst lassen.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Femikliman® uno soll während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Femikliman® uno

Dieses Arzneimittel enthält Lactose.

Bitte nehmen Sie Femikliman® uno daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Femikliman® uno nicht anders verordnet hat.

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Femikliman® uno sonst nicht richtig wirken kann.

Wie viele Filmtabletten und wie oft sollten Sie Femikliman® uno einnehmen?

Nehmen Sie 1 mal täglich 1 Filmtablette Femikliman® uno ein.

Wie und wann sollten Sie Femikliman® uno einnehmen?

Femikliman® uno soll mit ausreichend Flüssigkeit möglichst immer zur gleichen Tageszeit (morgens oder abends) eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Femikliman® uno anwenden?

Femikliman® uno soll ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Monate angewendet werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Femikliman® uno in zu großen Mengen eingenommen wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Bei Überdosierung von Femikliman® uno können die unter „Nebenwirkungen“ genannten Magenbeschwerden verstärkt auftreten.

Das Arzneimittel sollte dann abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Femikliman® uno auftreten?

Gelegentlich kann es zu Magenbeschwerden kommen; eine Gewichtszunahme ist möglich.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Packung aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Femikliman® uno aufzubewahren?

Nicht über 30 °C aufbewahren.

Stand der Information

März 2004

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!